

中皮腫

オブジーボ

催吐リスク: 1

適応疾患: 悪性胸膜中皮腫

投与スケジュール: 2週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
オブジーボ	240 mg/body	d1

カルボプラチン+ペトレキセド

催吐リスク: 3

適応疾患: 悪性胸膜中皮腫

投与スケジュール: 3週1コース (4~6コース予定)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
アリムタ	500 mg/m <sup>2</sup>	d1
カルボプラチン	5 AUC	d1

カルボプラチン+ペトレキセド(消化器)

催吐リスク: 3

適応疾患: 悪性腹膜中皮腫

投与スケジュール: 3週1コース (6コース予定)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
アリムタ	500 mg/m <sup>2</sup>	d1
カルボプラチン	5 AUC	d1

シスプラチン+ペトレキセド(呼吸器)

催吐リスク: 4

適応疾患: 悪性胸膜中皮腫

投与スケジュール: 3週1コース (4コース予定)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
アリムタ	500 mg/m <sup>2</sup>	d1
シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	d1

シスプラチン+ペトレキセド(呼吸器) [SHVer.]

催吐リスク: 4

適応疾患: 悪性胸膜中皮腫

投与スケジュール: 3週1コース (4コース予定)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
アリムタ	500 mg/m <sup>2</sup>	d1
シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	d1

シスプラチン+ペトレキセド(消化器)

催吐リスク: 4

適応疾患: 悪性腹膜中皮腫

投与スケジュール: 3週1コース (6コース予定)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
アリムタ	500 mg/m <sup>2</sup>	d1
シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	d1

適応疾患: 悪性腹膜中皮腫(切除不能)

投与スケジュール: 3週1コース (3~6コース予定)

## 使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
アバスタチン	15 mg/kg	d1
アリムタ	500 mg/m <sup>2</sup>	d1
シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	d1

## 推奨投与量の単位

mg/m<sup>2</sup>:【体表面積】あたりの量      mg/kg:【体重】あたりの量  
AUC:カルバートの式により算出 ⇒投与量(mg/body)=AUC目標値×(GFR+25)

## 略語の意味

NSCLC: 非小細胞肺癌  
SCLC: 小細胞肺癌  
PD: 病勢進行