



子宮頸

**weeklyシスプラチン+放射線治療**

催吐リスク: 4

適応疾患: 子宮頸がん(進行・再発、術後補助)

投与スケジュール: 1週1コース (6コースまで)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
シスプラチン	40 mg/m <sup>2</sup>	d1

**イリノテカン(4週1コース)**

催吐リスク: 3

適応疾患: 子宮頸がん(進行・再発)

投与スケジュール: 4週1コース (6コース)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
イリノテカン	100 mg/m <sup>2</sup>	d1, 8, 15

**イリノテカン+ネダプラチン**

催吐リスク: 3

適応疾患: 子宮頸がん(進行・再発)

投与スケジュール: 4週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
アクブラ	80 mg/m <sup>2</sup>	d1
イリノテカン	50 mg/m <sup>2</sup>	d1, 8, 15

**シスプラチン+イリノテカン**

催吐リスク: 4

適応疾患: 子宮頸がん(進行・再発)

投与スケジュール: 4週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
イリノテカン	60 mg/m <sup>2</sup>	d1, 8, 15
シスプラチン	60 mg/m <sup>2</sup>	d1

**ネダプラチン+放射線治療**

催吐リスク: 3

適応疾患: 子宮頸がん

投与スケジュール: 5週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
アクブラ	35 mg/m <sup>2</sup>	d1, 8, 15, 22, 29

**パクリタキセル+カルボプラチン**

催吐リスク: 3

適応疾患: 子宮頸がん(進行・再発)

投与スケジュール: 3週1コース (6コース予定)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
カルボプラチン	5 AUC	d1
パクリタキセル	175 mg/m <sup>2</sup>	d1

適応疾患: 子宮頸がん(進行・再発)

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
アバスタチン	15 mg/kg	d1
カルボプラチン	5 AUC	d1
パクリタキセル	175 mg/m <sup>2</sup>	d1

推奨投与量の単位

mg/m<sup>2</sup>:【体表面積】あたりの量      mg/kg:【体重】あたりの量  
 AUC:カルバートの式により算出 ⇒投与量(mg/body)=AUC目標値×(GFR+25)

略語の意味

NSCLC: 非小細胞肺がん  
 SCLC: 小細胞肺がん  
 PD: 病勢進行