



子宮体

ドキシソルピシン+シスプラチン

催吐リスク: 4

適応疾患: 子宮体がん(進行・再発、術後補助)

投与スケジュール: 3週1コース (3~6コース予定)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
アドリアシン	60 mg/m ²	d1
シスプラチン	50 mg/m ²	d1

ドセタキセル+カルボプラチン

催吐リスク: 3

適応疾患: 子宮体がん (進行・再発、術前・術後)

投与スケジュール: 3~4週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
カルボプラチン	6 AUC	d1
ドセタキセル	70 mg/m ²	d1

パクリタキセル+カルボプラチン

催吐リスク: 3

適応疾患: 子宮体がん(進行・再発)

投与スケジュール: 3週1コース (6コース予定)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
カルボプラチン	5 AUC	d1
パクリタキセル	175 mg/m ²	d1

パクリタキセル+カルボプラチン

催吐リスク: 3

適応疾患: 子宮がん肉腫

投与スケジュール: 3週1コース (6コース予定)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
カルボプラチン	6 AUC	d1
パクリタキセル	175 mg/m ²	d1

推奨投与量の単位

mg/m²:【体表面積】あたりの量 mg/kg:【体重】あたりの量
 AUC:カルバートの式により算出 ⇒投与量(mg/body)=AUC目標値×(GFR+25)

略語の意味

NSCLC: 非小細胞肺がん
 SCLC: 小細胞肺がん
 PD: 病勢進行