



肝

フルオロウラシル肝動注療法

催吐リスク: 1

適応疾患: 肝がん(原発性、転移性)

投与スケジュール: 1週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
5-FU	700 mg/m ²	d1

ミリプラチン肝動注

催吐リスク: 1

適応疾患: 肝細胞がん

投与スケジュール: 4~12週1コース (2コース予定)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
ミリプラチン注	120 mg/body	d1

動注用シスプラチン+リピオドール肝動注

催吐リスク: 4

適応疾患: 肝細胞がん

投与スケジュール: 4週1コース (2コース予定)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
アイエーコール	65 mg/m ²	d1

推奨投与量の単位

mg/m²:【体表面積】あたりの量 mg/kg:【体重】あたりの量
 AUC:カルバートの式により算出 ⇒投与量(mg/body)=AUC目標値×(GFR+25)

略語の意味

NSCLC: 非小細胞肺がん
 SCLC: 小細胞肺がん
 PD: 病勢進行