



絨毛

EMA/CO

催吐リスク: 3

適応疾患: 絨毛癌

投与スケジュール: 2週1コース (hCGがcut offになるまで or 効果がないと判断するまで)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
エトポシド	100 mg/m ²	d1、2
エンドキサン	600 mg/m ²	d8
オンコビン	0.8 mg/m ²	d8
コスメゲン	0.5 mg/body	d1、2
メトレキセート	300 mg/m ²	d1

コスメゲン

催吐リスク: 3

適応疾患: 胎状奇胎

投与スケジュール: 2~3週 1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
コスメゲン	0.01 mg/kg	d1~5

メトレキセート+ホリナートカルシウム

催吐リスク: 1

適応疾患: 侵入奇胎

投与スケジュール: 2週1コース (hCGがcut offになるまで or 効果がないと判断するまで)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
メトレキセート	1 mg/kg	d1, 3, 5, 7
ロイコボリン	0.1 mg/kg	d2, 4, 6, 8

推奨投与量の単位

mg/m²:【体表面積】あたりの量 mg/kg:【体重】あたりの量
 AUC:カルバートの式により算出 ⇒投与量(mg/body)=AUC目標値×(GFR+25)

略語の意味

NSCLC: 非小細胞肺癌
 SCLC: 小細胞肺癌
 PD: 病勢進行