



内分泌

ストレプトゾシン(5days)

催吐リスク: 4

適応疾患: 神経内分泌腫瘍

投与スケジュール: 6週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
ザノサー点滴静注	500 mg/m ²	d1~5

ストレプトゾシン(weekly)

催吐リスク: 4

適応疾患: 神経内分泌腫瘍

投与スケジュール: 1週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
ザノサー点滴静注	1000 mg/m ²	d1

ストレプトゾシン+フルオロウラシル

催吐リスク: 4

適応疾患: 神経内分泌腫瘍

投与スケジュール: 6週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
ザノサー点滴静注	500 mg/m ²	d1~5
フルオロウラシル	400 mg/m ²	d1~5

推奨投与量の単位

mg/m²:【体表面積】あたりの量 mg/kg:【体重】あたりの量
 AUC:カルバートの式により算出 ⇒投与量(mg/body)=AUC目標値×(GFR+25)

略語の意味

NSCLC: 非小細胞肺がん
 SCLC: 小細胞肺がん
 PD: 病勢進行