

糖尿病薬服用中の方に対する造影剤検査について

<p>メトグルコ錠 250mg 500mg</p>	<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT 500mgMT 三和</p>	<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT 500mgMT トーワ</p>
<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT 500mgMT 日医工</p>	<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT 500mgMT ニプロ</p>	<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT 500mgMT ファイザー</p>
<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT 500mgMT DSEP</p>	<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT 500mgMT JG</p>	<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT 500mgMT TCK</p>
<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT 500mgMT TE</p>	<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT 500mgMT 明治</p>	<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT 500mgMT DSPB</p>
<p>グリコラン錠 250mg</p>	<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mg トーワ</p>	<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mg SN</p>
<p>エクメット配合錠 LD HD</p>	<p>メタクト配合錠 LD HD</p>	<p>メアナ配合錠 LD HD</p>
<p>イニシンク配合錠</p>	<p>ジベトス錠 50mg</p>	<p>ブホルミン塩酸塩 50mg KO</p>

日本医学放射線学会 2021.3



ヨード系造影剤を使用する検査の場合、上記の糖尿病薬を服用中の方は、『検査日前後2日間の休薬』が必要となります。他のお薬の場合は、いつも通り内服していただいても構いません。