

患者さん向け指導箋

リネイル®ゲルの使用にあたり、患者さんへの説明の際にご使用ください。

リネイル®ゲル10% による治療を受けた方へ



リネイル®ゲルの詳細はこちら

* 医療関係者向けページに繋がります。



リネイル®の10%による治療を受けた方へ

今後の治療ステップ

Step 1


約24時間後に爪矯正具は装着したまま、保護テープを剥がして水または湯で洗い流します。



Step 2

治療効果が確認できれば、爪矯正具を取り外します。爪矯正具を取り外す時期は医師の指示に従ってください。

矯正が完了した状態



リネイル®ゲルを洗い流す時間

医療機関での塗布後、洗い流す時間を忘れないようメモしておきましょう。

午前・午後


時頃 に洗い流す

裏面の「洗い流した後の注意点」もご参照ください。

塗布翌日までに患者さん自身で行うこと

保護テープを剥がすまでは、本剤の漏出を防ぐため、患部を濡らさないようにしましょう。

- 入浴はできるだけ湯船に入らず、シャワーを利用してください。
- その際は、ラップやビニールなどで足部を保護してください。




塗布してから約24時間後に、保護テープを剥がして本剤を必ず洗い流してください。

- 爪周辺や手指に本剤が残らないように水または湯で十分に洗い流してください。



保護テープを剥がすとき・本剤を洗い流すときは、爪矯正具が外れないように注意してください。

- ・保護テープを剥がすときは、指の腹側も含めて周囲からゆっくり剥がしましょう。特に、保護テープが足の指から離れるときに、爪矯正具が外れないよう手で押さえましょう。
- ・洗い流すときは、患部を強くこすらないように注意しましょう。



洗い流した後の注意点

- 爪矯正具が外れないよう、必要に応じて医療用テープ等で保護してください。また、装着している爪矯正具の取り扱いに注意して生活してください。
- 医師等に指示された期間は治療継続のために爪矯正具を装着し続けてください。



下記の場合には、医療機関を受診し、医師へご相談ください

- ・痛み、刺激や違和感、肌のかぶれ、爪の割れなどの異常が生じた場合。
- ・本剤を洗い流すまでに患部が濡れた場合。
 - ▶ すぐに保護テープを剥がして本剤を洗い流し、医師に相談してください。
- ・爪矯正具が外れたり、変形または破損した場合。
 - ▶ 廃棄せず可能な限り現物をご持参のうえ治療を受けた医療機関を受診してください。

巻き爪についてもっと詳しく！

原因や予防法の
徹底解説サイトはこちら



LINE友だち募集中！

・治療後の巻き爪のケア方法
・再発を予防！靴の正しい選び方
などのお役立ち情報を配信♪



リネイル®ジェルについてもっと詳しく！

専用サイトはこちら



